



+90 (542) 230 14 36 | +90 (543) 230 14 36 | info@yfagro.com
Camitak Mah. Nevzat İspir Cad. No:5/206 Ilgın / Konya / Türkiye




Ürün Kataloğu

Product Catalog



Sürdürülebilir Çözümler, Geleceğe Yön Veren Tarım

Sustainable Solutions, Future-Driven Agriculture



About Us **HAKKIMIZDA**

YF AGRO, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve bitki besleme ürünleri üreten öncü bir firmadır. Modern tarım tekniklerine olan bağlılığımız ve sürdürülebilir üretim anlayışımız sayesinde, çiftçilerimizin verimliliğini ve ürün kalitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle bitki sağlığını beslerken, çiftçilerin daha sağlıklı ve verimli mahsuller elde etmelerini sağlıyoruz. Yılların birikimi, tecrübeli uzman kadromuz ve sürekli gelişim vizyonumuz ile tarımın geleceğine katkı sağlamaya ve sektörde lider konumumuzu güçlendirmeye kararlıyız.

YF AGRO is a leading company operating in the agricultural sector and producing plant nutrition products. Thanks to our commitment to modern agricultural techniques and sustainable production practices, we aim to maximize the productivity and product quality of farmers. With our wide range of products, we nourish plant health while ensuring farmers achieve healthier and more productive crops. With years of experience, our expert team, and our vision for continuous development, we are determined to contribute to the future of agriculture and strengthen our leadership position in the industry.

Sınırları Aşan Başarı **Success Beyond Boundaries**

Yerli üretim gücümüzle, farklı ülkelerdeki pazarlara değer katıyoruz. Küresel başarıyı hedefleyerek, her geçen gün daha fazla ülkeye kaliteli ürünler sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak, uluslararası ticaretteki güçlü yerimizi pekiştiriyoruz.

With our local production strength, we add value to markets in different countries. Aiming for global success, we provide quality products to more countries every day. By offering reliable, innovative, and sustainable solutions to our customers around the world, we strengthen our strong position in international trade.



- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Türkiye Turkey | ☐ Moğolistan Mongolia | ☐ Fas Morocco |
| ☐ Mısır Egypt | ☐ Vietnam Vietnam | ☐ İtalya Italy |
| ☐ Azerbaycan Azerbaijan | ☐ Türkmenistan Turkmenistan | ☐ Bosna Hersek Bosnia-Herzegovina |
| ☐ Özbekistan Uzbekistan | ☐ Tunus Tunisia | ☐ İngiltere England |
| ☐ Kazakistan Kazakhstan | ☐ Gana Ghana | ☐ Norveç Norway |
| ☐ Kırgızistan Kyrgyzstan | ☐ Fildişi Sahili Ivory Coast | ☐ ABD USA |

Costanzo

soil conditioner


Yüksek oranda organik madde (humik+fulvik asit) ile birlikte azot içeren bitkisel ve hayvansal menşeli amino asit çözeltisidir. Bitkilerin aşırı ya da düşük sıcaklık, kuraklık, su yetersizliği gibi olumsuz şartlara karşı dayanma süresini uzatır.

It is a plant and animal-based amino acid solution containing high levels of organic matter (humic + fulvic acid) along with nitrogen. It extends the duration of plants' resistance to adverse conditions such as excessive or low temperatures, drought, and water scarcity.



Kullanım Dozları | Usage Doses

Bitki	Uygulama Zamanı	Yapraktan gr/dk (100L su ile)	Damla Sulamadan Cc/Dk (1 Ton Su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar.	50	100
Karpuz-Kavun-Kabak	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar.	2	100
Fasulye-Nohut-Mercimek	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar.	50	100
Çilek	Fide dikiminden 10-15 gün sonra çiçeklenme döneminden itibaren.	50	100
Bağ-Kivi	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde hasada kadar hasat sonrası 15 gün ara ile 2 uygulama.	75	150
Muz	Yapraktan ya da damla sulamadan verilen diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir.	3	175
Narenciye	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde gelişme dönemi boyunca.	50	100
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde gelişme dönemi boyunca.	75	175
Elma-Armut-Ayva	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde gelişme dönemi boyunca.	75	175
Zeytin	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde gelişme dönemi boyunca.	3	150
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde gelişme dönemi boyunca.	50/75	150
Mısır-Ayçiçeği	İlk çıkıştan 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar.	75	200
Patates-Havuç	Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır.	75	150
Soğan-Sarımsak	Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır.	50	125
Şeker Pancarı	Ekimden sonra (çıkış öncesinde) yabancı ot ilacı ile birlikte.	75	125
Buğday-Arpa-Çeltik	Yapraktan: kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde.	50/75	-
Pamuk	Yapraktan: bitkiler 3-5 yapraklı olunca ve erken çiçek döneminde. Damla sulamadan: tohum yatağı hazırlanırken.	50	100
Yapraklı Yeneni Sebze (Marul,Kivirak,Lahanayb.)	Gelişme dönemi boyunca.	50	100
Yeşil Alanlar Süs Bitkileri	Fide dikiminden ya da çiçek kesiminden itibaren gelişme dönemi boyunca.	50	100



Ek Bilgiler | Additional Information

- Düşük moleküler ağırlığı sayesinde çok hızlı alımın, taşınma ve faydalanma sağlar.
- **Due to its low molecular weight, it allows for rapid absorption, transportation, and utilization.**
- İçeriğindeki yüksek orandaki amino asitler bitkinin abiotik stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır.
- **The high levels of amino acids in its composition increase the plant's resistance to abiotic stress conditions.**
- İçeriğindeki serbest amino asitler ve kısa zincirli peptitler (Oligo peptitler) nedeniyle klorofil sentezi, fertilité, enzim aktivatörü ve şelatlayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar.
- **Thanks to the free amino acids and short-chain peptides (oligopeptides) it contains, it enhances chlorophyll synthesis, fertility, enzyme activation, and chelating effects, ensuring optimal vegetative and generative development of the plant.**
- İçeriğindeki uzun zincirli peptitler ile topraktaki kalıcı etkisinden dolayı uzun süreli ve istikrarlı (kalıcı) etkinlik sağlar.
- **With its long-chain peptides, it provides long-lasting and stable (permanent) effects due to its persistent impact on the soil.**
- Ürünün iç ve dış kalitesini buna bağlı olarak meyve kalitesini artırır.
- **It improves both the internal and external quality of the product, thereby enhancing fruit quality.**
- Pazarlanabilir ürün miktarında artış sağlar.
- **It increases the amount of marketable product.**
- Toprak düzenleyici özelliği ile daha güçlü kök yapısı oluşturarak bitkinin besin maddelerinden daha etkili yararlanmasını sağlar.
- **Its soil-conditioning property helps the plant develop a stronger root system, enabling more effective absorption of nutrients.**

İnovasyon | Innovation

Tarım sektöründe sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştirerek, çiftçilerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

We continuously develop innovative solutions in the agricultural sector to meet the changing needs of our farmers.

Kalite | Quality

Ürünlerimizde en yüksek kalite standartlarını benimseyerek, çiftçilerimize güvenilir ve etkili çözümler sunuyoruz.

By adopting the highest quality standards in our products, we provide reliable and effective solutions to our farmers.





Sürdürülebilirlik | Sustainability

Çevreye duyarlı üretim yöntemleri ile sürdürülebilir tarımı destekliyor ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

We support sustainable agriculture with environmentally friendly production methods and aim to leave a livable world for future generations.

Müşteri Odaklılık | Customer Focus

Memnuniyet ve ihtiyaçları ön planda tutarak, başarınızı kendi başarımız olarak görüyor beklentilerinizi aşmak için çalışıyoruz.

By prioritizing satisfaction and needs, we consider your success as our own and work to exceed your expectations.

Pro Floem

soil conditioner

Tohum çimlenmesinden gövde büyümesine, yaprak gelişiminden çiçeklenmeye geçişi ve cinsiyet belirlenmesini tetikler. Gibberellik asidi en aktif olarak stamenlerde bulunur ve erkek çiçek üretimi ile çiçek sap gelişimini etkiler.

It triggers the transition from seed germination to stem growth, leaf development, flowering, and sex determination. Gibberellic acid is most active in the stamens, influencing male flower production and flower stalk development.



Kullanım Dozları | Usage Doses

Bitki	Uygulama Zamanı	Yapraktan gr/dk (100L su ile)	Damla Sulamadan Cc/Dk (1 Ton Su ile)
Domates-Biber-Patlıcan	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanır. Çiçeklerin %50 döneminde 2 uygulama yapılır. 3. Uygulama 20 gün sonra yapılmalı.	2	3
Karpuz-Kavun-Kabak	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanır bitki tutum dönemi ve gelişim dönemine kadar uygulanması uygundur.	2	3
Fasulye-Nohut-Mercimek	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanır bitki tutum dönemi ve gelişim dönemine kadar uygulanması uygundur.	1	2
Çilek	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde-Gelişme dönemi boyunca.	1	2
Bağ-Kivi	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde-Gelişme dönemi boyunca.	1	3
Muz	Yapraktan ya da damla sulamadan verilen diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir.	3	6
Narenciye	Yapraktan ya da damla sulamadan verilen diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir.	2	4
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde çiçek tutulumunu artırmak sapları daha sağlam yapmak ve kalibreyi artırmak için kullanımı uygundur.	3	4
Elma-Armut-Ayva	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde çiçek tutulumunu artırmak sapları daha sağlam yapmak ve kalibreyi artırmak için kullanımı uygundur.	3	4
Zeytin	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde çiçek tutulumunu artırmak sapları daha sağlam yapmak ve kalibreyi artırmak için kullanımı uygundur.	3	4
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı-Badem	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde çiçek tutulumunu artırmak sapları daha sağlam yapmak ve kalibreyi artırmak için kullanımı uygundur.	3	4
Mısır-Ayçiçeği	7/8 yaprak döneminde koçan döllenmesinden 2 hafta sonra verimi artırmak için verilir. Mısırdaki püskül ölü döllenmeyi ve gelişimi artıracak için kullanımı uygundur.	2	4
Patates-Havuç	Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır. Özellikle çiçek dönemi öncesi.	2	4
Soğan-Sarımsak	Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır.	2	4
Şeker Pancarı	2/4/6/8/12 yaprakları arasında kullanımı uygundur pancarı uzatma geliştirme ve şeker tutulumunu artırmak için kullanılır.	2	4
Buğday-Arpa-Çeltik-Kanola	Yapraktan: Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde ve sapa kalkma döneminde uygulanır.	1	-
Pamuk	Yapraktan: Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde ve sapa kalkma döneminde uygulanır.	1	3
Yapraklı Yenen Sebzeler (Marul,Kıvrak,Lahana,y.b.)	Gelişme dönemi boyunca.	1	2
Yeşil Alanlar Sûs Bitkileri	Fide dikiminden ya da çiçek kesiminden itibaren gelişme dönemi boyunca.	2	4
Üzüm	Çiçek kapsüllerin dökülmesinden 4/5 gün sonra verimi artırmak amacıyla kullanılır.	2	4
Çay	Sürgünler uyandırdığında ve budamadan 5 gün sonra vermek ve gelişim dönemi boyunca uygundur.	2	4



Ek Bilgiler | Additional Information

- Düşük moleküler ağırlığı sayesinde çok hızlı alımla, taşınma ve faydalanma sağlar.
- **Due to its low molecular weight, it allows for rapid absorption, transportation, and utilization.**
- İçeriğindeki yüksek orandaki amino asitler bitkinin abiotik stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır.
- **The high levels of amino acids in its composition increase the plant's resistance to abiotic stress conditions.**
- İçeriğindeki serbest amino asitler ve kısa zincirli peptitler (Oligo peptitler) nedeniyle klorofil sentezi, fertilitate, enzim aktivatörü ve şelatlayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar.
- **Thanks to the free amino acids and short-chain peptides (oligopeptides) it contains, it enhances chlorophyll synthesis, fertility, enzyme activation, and chelating effects, ensuring optimal vegetative and generative development of the plant.**
- İçeriğindeki uzun zincirli peptitler ile topraktaki kalıcı etkisinden dolayı uzun süreli ve istikrarlı (kalıcı) etkinlik sağlar.
- **With its long-chain peptides, it provides long-lasting and stable (permanent) effects due to its persistent impact on the soil.**
- Ürünün iç ve dış kalitesini buna bağlı olarak meyve kalitesini artırır.
- **It improves both the internal and external quality of the product, thereby enhancing fruit quality.**
- Pazarlanabilir ürün miktarında artış sağlar.
- **It increases the amount of marketable product.**
- Toprak düzenleyici özelliği ile daha güçlü kök yapısı oluşturarak bitkinin besin maddelerinden daha etkili yararlanmasını sağlar.
- **Its soil-conditioning property helps the plant develop a stronger root system, enabling more effective absorption of nutrients.**



Doğayı Besler, Başarıyı Büyütür.
**Nourishes Nature, Grows
Success.**





Maxguss

soil conditioner


Maxguss, bitkilerin doğal büyüme hormonlarını bir araya getirerek, bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlar. 65'in üzerinde bitki özünden elde edilen bu özel formül, bitkilerin stres koşullarına karşı direncini artırır.

Maxguss harnesses the power of natural plant hormones to promote healthier, more productive plants. Crafted from over 65 plant extracts, this specialized formula enhances plant resilience against stress.



Kullanım Dozları | Usage Doses

Bitki	Uygulama Zamanı	Yapraktan gr/dk (100L su ile)	Damla Sulamadan Cc/Dk (1 Ton Su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca	2,5 - 10 gr	-
Çilek	Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca	2,5 - 10 gr	-
Karpuz-Kavun-Kabak	Bitkilerin 2-3 yapraklı olduğu dönemden itibaren	2,5 - 10 gr	-
Bağ-Kivi	1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Geliştirme dönemi boyunca	4 - 16 gr	-
Muz	1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Geliştirme dönemi boyunca	10 - 30 gr	-
Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı	1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Geliştirme dönemi boyunca	10 - 30 gr	-
Elma-Armut-Ayva	1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Geliştirme dönemi boyunca	2,5 - 10 gr	-
Zeytin	1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Geliştirme dönemi boyunca	2,5 - 10 gr	-
Mısır-Ayçiçeği	1. uygulama: Bitkiler 15-20 cm olunca 2. uygulama: Bitkiler 40-50 cm olunca	10 - 30 gr	-
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	1. uygulama: Bitkiler 4-5 yapraklı olunca 2. uygulama: Yumru irileşme döneminde	10 - 30 gr	-
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminden itibaren	2,5 - 10 gr	-
Pamuk	Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren	2,5 - 10 gr	-
Soğan-Sarımsak	1. uygulama: Bitkiler 4-5 yapraklı olunca 2. uygulama: Baş irileşme döneminde	2,5 - 10 gr	-
Fasulye-Nohut Mercimek	Geliştirme dönemi boyunca	2,5 - 10 gr	-
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kivircık, Lahana)	Geliştirme dönemi boyunca	2,5 - 10 gr	-
Yeşil alanlar- Süs Bitkileri	Geliştirme dönemi boyunca	2,5 - 10 gr	-
-	Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.	-	-



Ek Bilgiler | Additional Information

- Maxguss® kök büyümesini uyarır.
- **Contains Maxguss® root.**
- Daha iyi gelişmiş kökler tarafından besin alımını artırır.
- **Increasing nutrient uptake by better developed roots.**
- Azot dekompoze edici bakteriler ile etkileşim içindedir. (Azot sadece amonyak bileşenleri ile bitkiler tarafından alınır.yani diğer azot kaynakları kesilmiş olmalıdır)
- **It communicates with nitrogen separation regulations. (Nitrogen is taken up by plants only with ammonia compounds. So other nitrogen sources should be cut off)**
- Doğrudan bitkiye (osmoz yoluyla kökleri / yaprak) Yüksek enerji beslenme transferini sağlar.
- **Provides high energy nutrition transfer directly to the plant (plants/leaves via osmosis).**
- Tomurcuk oluşumu / çiçek-oluşumunu uyarır. Besin ihtiyacını azaltır çünkü Toprakta mevcut besin daha etkin kullanılacaktır, (Göteborg Botanik)
- **Includes bud formation/flower-formation. Nutrients decrease because the nutrients available in the soil will be used more effectively, (Göteborg Botany**
- Bahçesi, allgrow sonrası herhangi gübreleme yapmadığını belirtmiştir)
- **His garden stated that he did not fertilize anything after allgrow)**
- İyi bir şekilde Periyodik kompost eklemek , yeşil kısımları durdurmak için varolan bakterileri uyarır.
- **Choose good periodic compost, it contains parts for parts of the green parts.**
- Bitkileri için hasat sonrası dayanıklılığını artırır. (Yaşlılık = yaprakların ve yeşil parçaların yaşlanmasını dengeleyerek)
- **Increases post-harvest value for crops. (Old age = balancing the decline of growth and green)**
- Filizlenmede bitkiler uyarır. brokoli, vb bitkilerin yeşil kısımlarını artırır.
- **Parameters in sprouting. broccoli, etc. increases green parts.**